

โจทย์คำถามก่อนการเรียนรู้ เรื่อง snake bite

1. เด็กหญิงไทย 10 ปี โดนงูไม่ทราบชนิดกัดบริเวณขาซ้าย 2 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล ที่ห้องฉุกเฉินมีอาการอาเจียน หน้าตาปิด หายใจเหนื่อย ยกแขนขาไม่ขึ้น รอบๆแผลบริเวณขาซ้ายบวมคล้ำมาก ท่านจะให้การรักษาอย่างไรตามลำดับ
2. ชายไทย 40 ปี ให้ประวัติว่า 3 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาลขณะกำลังตัดยาง รู้สึกเจ็บบริเวณเท้าขวา ก้มดูมีเลือดออก ผู้ป่วยไม่เห็น สัตว์ชนิดใดบริเวณนั้น ที่ห้องฉุกเฉินตรวจพบบาดแผลรอยเขียว 2 จุด บริเวณรอบๆแผล ไม่บวม ผู้ป่วยไม่มีอาการปวดหรืออาการ ผิดปกติอื่น ท่านมีแนวทางการรักษาอย่างไร
3. เด็กชาย 3 ปี มารดาให้ประวัติว่าเวลาประมาณตีสอง ขณะผู้ป่วยนอนบนเสื่อที่บ้าน ผู้ป่วยร้องและบอกปวดบริเวณแขนซ้าย มารดา ดูที่แขน เห็นรอยแผลจุดเลือดออกเล็กน้อย มองไปบริเวณรอบๆเห็นหนูวิ่งอยู่ข้างเสื่อ มารดากล่อมให้ผู้ป่วยนอนต่อ หลังจากนั้นอีก สามชั่วโมง มารดาได้ยินเสียงผู้ป่วยหายใจครืดคราด เรียกไม่รู้สีกตัว จึงพาไปโรงพยาบาลชุมชน ท่านเป็นแพทย์เวร จะดูแลผู้ป่วยราย นี้ได้อย่างไร
4. ชายไทย 50 ปี โดนงูเขียวหางไหม้กัดบริเวณนิ้วชี้มือขวา มา 2 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล ท่านตรวจพบนิ้วชี้ขวา ไม่บวม แต่ผู้ป่วย ปวดมาก เจาะ VCT = 7 นาที ผลเลือด CBC อยู่ในเกณฑ์ปกติ อีก 2 ชั่วโมงถัดมา พบว่ามือขวาบวมจนถึงข้อศอก มีถุงน้ำค้ำๆขึ้น รอบๆแขน ผู้ป่วยปวดมากและมีเลือดออกบริเวณริมฝีปากและไรฟัน ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ท่านจะทำการรักษาอย่างไรต่อไป
5. เด็กหญิง 4 ปี ไปเที่ยวสวนสัตว์ ขณะกำลังตั้งใจชมการแสดงงูเห่า โดนงูเห่าพันพิษใส่ตาทั้งสองข้าง ผู้ป่วยมองเห็นปกติ แต่รู้สึกเคือง ตามาก มารดากังวลจึงนำส่งโรงพยาบาล ท่านเป็นแพทย์เวรจะให้การรักษาผู้ป่วยรายนี้ได้อย่างไร
6. ชายไทย 30 ปี ขณะกำลังทำงานโดนงูทับสมิงคลากัดบริเวณขาขวา มีรอยเขียวช้ำชัดเจน อาการทั่วไปปกติดี ญาตินำตัวมาที่ โรงพยาบาลด้วย ท่านเป็นแพทย์เวรพิจารณาแล้วต้องให้เซรุ่มต้านพิษงูทันที

ก่อนให้เซรุ่มต้านพิษงู พยาบาลถามท่านว่า

- 6.1 ต้องพิจารณาทำการทดสอบผิวหนัง (skin test) หรือไม่ อย่างไร
- 6.2 ต้องให้ยาป้องกันอาการแพ้ก่อนการให้เซรุ่มต้านพิษหรือไม่
- 6.3 ท่านตัดสินใจให้เซรุ่มต้านพิษงู หลังจากให้เซรุ่มต้านพิษงู ผู้ป่วยเกิดอาการหอบเหนื่อย แน่นหน้าอก มีผื่นขึ้นบริเวณลำตัว และมีความดันโลหิตตก ท่านจะมีแนวทางการรักษาอย่างไรต่อไป

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

7 มีนาคม 2566

โจทย์คำถามก่อนการเรียนรู้ เรื่อง rabies and tetanus

1. ผู้ป่วยหญิง 35 ปี ไม่มีโรคประจำตัว โดนสุนัขจรจัดกัดเมื่อเดือนที่แล้ว เป็นแผลเลือดออกที่ขาขวา ผู้ป่วยไม่ได้ไปพบแพทย์ ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ามาก่อน วันนี้เพิ่งฟังข่าวเรื่องพิษสุนัขบ้า รู้สึกกังวล จึงมาโรงพยาบาล ท่านมีแนวทางการให้วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและบาดทะยักแก่ผู้ป่วยรายนี้อย่างไร
2. เด็กชาย 15 ปี ให้ประวัติโดนแมวเลียบริเวณดวงตาและใบหน้า และมีบาดแผลฉีกขาดตามลำตัวจากการถูกแมวกัด บาดแผลมีเลือดออก ผู้ป่วยยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ามาก่อน ท่านมีแนวทางรักษาผู้ป่วยรายนี้อย่างไร
3. ผู้ป่วยหญิง 35 ปี โดนสุนัขกัดบริเวณแขนซ้าย แผลมีเลือดออก เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบเมื่อ 2 ปีก่อน และได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักล่าสุดเมื่อ 10 ปีก่อน วันนี้ท่านมีแนวทางรักษาผู้ป่วยรายนี้อย่างไร
4. ชายอายุ 40 ปี โดนหนูกัดที่นิ้ว วินิจฉัยเป็น Mammal bite category 3 ผู้ป่วยไม่เคยโดนสัตว์กัดมาก่อน ผู้ป่วยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ชนิด verorab route IM แต่ทดสอบ ERIG แพ้ จึงได้รับการส่งตัวมารักษาต่อยังโรงพยาบาลของท่าน
 - 4.1 ท่านจะทำการรักษาผู้ป่วยรายนี้ต่อไป กรณี ทดสอบ ERIG แพ้ ที่โรงพยาบาลชุมชน
 - 4.2 หากวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าหมดไปที่ต้องฉีดต่อเนื่อง ผู้ป่วยต้องการมาฉีดที่โรงพยาบาลของท่าน ท่านจะพิจารณาฉีดวัคซีนชนิดใด และ route ของการฉีดแบบใดต่อ
5. หญิงไทย 50 ปี ได้รับการวินิจฉัย Dog bite category 2 และฉีด vaccine verorab 1 course ในวันที่ 0, 3, 7 และ 28 หากผู้ป่วยมาฉีดแล้ว 2 ครั้งในวันที่ 0, 3 และเข็มที่ 3 มาฉีดวันที่ 14 ท่านมีแนวทางดูแลผู้ป่วยรายนี้อย่างไร
6. ชายไทย 30 ปี มาปรึกษาท่านว่าโดนสุนัขที่เลี้ยงเองกัดขณะกำลังให้อาหาร มีเลือดออกบริเวณมือขวา ผู้ป่วยมีประวัติเคยได้รับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบเมื่อ 1 ปีก่อน และสุนัขอายุ 6 เดือนเพิ่งได้รับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเมื่อ 3 วันก่อน เป็นสุนัขเลี้ยงในบ้าน ไม่ได้ออกไปนอกบ้าน ท่านจะมีแนวทางการอธิบายและรักษาผู้ป่วยรายนี้อย่างไร

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

7 มีนาคม 2566